



Funded by
the European Union



AGROecological strategies for SUstainable weed management in key European crops

Yedra Vieites Álvarez


23/04/2026. XVI SEAE, Pamplona





Funded by the European Union

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No GA 101084084



UNIWERSYTET ROLNICZY
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie



Eesti Maaülikool
Estonian University of Life Sciences



SOPRONI
EGYETEM



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO



Universida de Vigo



Universidad
Politécnica
de Cartagena



UNIVERSIDADE da MADEIRA



Madeira island




Descripción y enfoque

11 Regiones biogeográficas

3 tipos de agrosistemas

31 cultivos de relevancia económica



10 ARABLE CROPS	12 PERENNIAL CROPS
Barley	Almond
Cotton	Apple
Maize	Apricot
Oats	Berry
Potato	Custard apple
Rapeseed	Hazelnut
Soybean	Olive
Sunflower	Orange
Triticale	Peach
Wheat	Persimmon
	Pistachio
	Vineyard
9 HORTICULTURAL CROPS	3 FARMING SYSTEM
Aromatic plants - 3sp. (Vinca, Rumex, Plantago)	Conventional
Cabbage	Organic
Carrot	Mixed
Lettuce	
Melon	
Tomato	
Zucchini	

Objetivos



Proporcionar
herramientas
de manejo
sostenible de
cultivos



Construir redes locales



Incrementar la digitalización



Identificar las principales
arvenses y problemas de
los agricultores



Evaluar el potencial
agronómico de las
estrategias



Iniciar un cambio en la
gestión de las arvenses
en Europa



Búsqueda de nuevas
estrategias





Evaluar el impacto
ambiental y
socioeconómico

02 Experimentos de Viñedos en Galicia


A corto plazo y a largo plazo

Cultivos en Galicia-Región Atlántica



Ensayos
corto plazo

**Implantación de diferentes
estrategias agroecológicas**



Ensayos
largo plazo

Ecológico vs Convencional

¿Cómo se deciden las estrategias?

 Encuestas y entrevistas

 Talleres de co-creación

 Talleres de validación



Asesores



Científicos



Políticos



Industria



Asociaciones



Agricultores



Sociedad civil

¿Qué medimos?

Análisis de salud vegetal

- Estado fenológico
- Detección de plagas o enfermedades
- Análisis elemental e isotópico
- Fluorescencia de la clorofila *a*
- Tamaño tallos, área foliar, altura planta, altura corona, diámetro tronco
- % Brotación
- Nº de racimos/rama
- Índice Ravaz
- Producción

Análisis de flora espontánea

- Cobertura de malezas
- Densidad
- Biomasa
- Banco de semillas

Análisis de suelo

- Densidad aparente
- Contenido hídrico
- C y N totales
- pH, Conductividad eléctrica, Intercambio de iones
- Análisis de elementos esenciales
- Biodiversidad
- Impacto eco-toxicológico

Análisis producto agrícola

- Peso de racimo y tamaño de uva
- Peso de 200 uvas
- Peso medio de una uva
- Nº de uvas/racimo
- Grados brix
- Acidez, acidez total y pH
- Contenido de sólidos solubles totales
- Contenido de L-malato, tartárico, antocianinas, polifenoles



03 Experimento Corto Plazo


Vilachán-Tomiño

Viñedo Corto Plazo

Parcela Viñedo en
Vilachán – Tomiño
(Galicia)




También convencional
largo plazo



Experimento Corto Plazo

11



- Siembra controlada (*Poa* sp., *Agrostis* sp. *Trifolium* sp. y *Festuca* sp.)
- Corteza de pino
- Biofilm
- Herbicida - Glifosato
- Bioherbicida – Beloukha + Control mecánico

4 rep/trat: 2 líneas con 10 plantas

Cada tratamiento= 80 plantas



Resultados – Flora espontánea

Siembra Controlada



1 mes



Final



Cobertura: 90%
Predominan especies controladas

Resultados – Flora espontánea

Biofilm



1 mes



Final



Cobertura: 80%
Predomina *Chenopodium* spp., *Erygeron* spp, *Plantago lanceolata* y *Trifolium* spp

Resultados – Flora espontánea

Corteza de pino



1 mes



Final



Cobertura: 70%
Focos más aislados y menos desarrollados

Resultados – Flora espontánea

Bioherbicida



1 mes



Final



Cobertura: 90%

Flora arvense de menor envergadura



Resultados – Flora espontánea

Herbicida



1 mes



Final




Cobertura: 40%

Presencia de especies resistentes: *Erygeron* spp y *Chenopodium* spp

Resultados – Experimento Corto Plazo

Salud de la Planta


17



Diferencias significativas con respecto al herbicida:

- Altura Corona
- Nº Ojos

Resultados – Experimento Corto Plazo




Producto

Diferencias significativas con respecto al herbicida:
- Calibre

Resultados – Experimento Corto Plazo

19



Producción

No hay diferencias significativas con respecto al herbicida

04 Experimento Largo Plazo

Baldrás - Tui – Tomiño – Salvaterra do Miño

Viñedos Largo Plazo - Ecológicos

Espaldera



CONV

Parra



ECO



Resultados Flora Espontánea - Ecológico vs Convencional

22

Ecológico Espaldera

Cobertura:
45%
Predomina
Mentha sp.



Convencional Espaldera

Cobertura: 40%
Presencia de
especies
resistentes:
Erygeron spp. y
*Chenopodium
spp.*



Resultados Flora Espontánea - Ecológico vs Convencional

23

Ecológico Parra



Cobertura: 70%
Predominan
monocotiledóneas
como *Cynodon* sp.
o *Paspalum* sp.


Convencional Parra




Cobertura: <5%
Mayor
presencia en las
zonas de
fertirrigación
por goteo



Resultados – Largo Plazo Espaldera – Ecológico vs Convencional




Salud de la Planta



Diferencias significativas en:

- Largo Rama
- Altura
- Nº Racimos
- Diámetro tronco


Resultados – Largo Plazo Espaldera – Ecológico vs Convencional




Producto

- Diferencias significativas en:
- Peso Uvas sin Raspón
 - Calibre
 - Peso Medio Uva
 - Grados Brix
 - % Alcohol
 - Acidez Total

Resultados – Largo Plazo Parra – Ecológico vs Convencional







Salud de la Planta



Diferencias significativas en:
- Diámetro tronco

Resultados – Largo Plazo Parra – Ecológico vs Convencional




Convencional Parra Ecológico Parra


Producto

Diferencias significativas en:

- Peso Racimo
- Peso Uvas sin Raspón
- Grados Brix
- % Alcohol



<https://agrosus.eu/weeds-database>



AGROSUS Weeds database

Use the following menu to filter the database. You can search inside the common name or scientific name and filter by crop, country, life cycle (season) and type of weed.

Select language

-- Click to select language --

Used for searching and displaying common name(s)

Enter text to search into common names

Enter text to search into scientific name

Crops

-- Click to select crop --

Select all the options you want to include in the results

Countries

-- Click to select country --

Select all the options you want to include in the results

Life cycle

Winter Spring Summer Autumn

Type

Annual Biennial Perennial

Submit

Clean filters

Picture (vegetative state)	Scientific name	Common name	Type	Life cycle	Crops	European countries	
	Abutilon theophrasti Medik.	Velvetleaf (GB), Velvet weed (GB), Abutilon- hemp (GB), China-jute (GB)	Annual	Spring Summer Autumn	Maize Soybean Beans Sunflower Cotton Lettuce Tomato	AL AT BY BE BA BG HR DK EE FI FR DE GB GR HU IE IT LT LU ME NL NO PL PT RO RU RS SK SI ES SE CH TR UA MK	 Data sheet  Contribute!
				Winter		AL AT BG HR CZ DK EE FI FR DE	

Scientific name

Abutilon theophrasti Medik.

 Access more info at [PI@ntNet](#) [WeedScience](#)

 Send your suggestions!

If you have any additional information about this weed, please let us know!

 Fill in the form! 

Basic information

Type: [Annual](#)Life cycle: [Spring](#) [Summer](#) [Autumn](#)
 Crops: [Maize](#) [Soybean](#) [Beans](#) [Sunflower](#)
[Cotton](#) [Lettuce](#) [Tomato](#)

Location

 Countries: [AL](#) [AT](#) [BY](#) [BE](#) [BA](#) [BG](#)
[HR](#) [DK](#) [EE](#) [FI](#) [FR](#) [DE](#) [GB](#)
[GR](#) [HU](#) [IE](#) [IT](#) [LT](#) [LU](#) [ME](#)
[NL](#) [MK](#) [NO](#) [PL](#) [PT](#) [RO](#) [RU](#)
[RS](#) [SK](#) [SI](#) [ES](#) [SE](#) [CH](#) [TR](#)
[UA](#)

 Notes: Few incidence in Luxembourg, Lithuania, Albania,
 Belarus, Montenegro, North Macedonia,

 Main european biogeographic regions: [Continental](#) [Black Sea](#)
[Mediterranean](#) [Alpine](#) [Atlantic](#) [Boreal](#) [Macaronesian](#)
[Pannonian](#) [Steppic](#) [Anatolian](#) Notes: Few incidence in Alpine
 region

Herbicides

Active ingredients: Glyphosate, Pendimethalin, Bentazon, Mesotrione, Dimethenamid-P, Rimsulfuron (aka renriduron), Flumioxazin, Pyridate, Sulcotrione, MCPA, Thifensulfuron-methyl, 2,4-D, Dicamba, Imazamox, Nicosulfuron, Fluroxypyr, Florasulam

Commercial names: Roundup Ultra Plus, Banvel-D, Casper, Callisto Plus, Pulsar 40, Basagran L, Stomp Aqua, Spectrum, Tensira 200 Ec, Crew, Onyx, Dragster, Decano Od


Resistances developed to herbicides: HRAC 5 PSII inhibitors – Serine 264 Binders

Images

Vegetative state



Reproductive state



Agroecological strategies

Cultural strategies

Cover crops [GOOD](#)Crop rotation [GOOD](#)

Mechanical/Physical strategies

Mulching [GOOD](#)

Solarization

SHARES



Belarus, Montenegro, North Macedonia,

Main european biogeographic regions: [Continental](#) [Black Sea](#)
[Mediterranean](#) [Alpine](#) [Atlantic](#) [Boreal](#) [Macaronesian](#)
[Pannonian](#) [Steppic](#) [Anatolian](#) Notes: Few incidence in Alpine region

Images

Vegetative state



Source: Pl@ntNet

Reproductive state



Source: Pl@ntNet

Seedling stage



Source: PlantwisePlus Knowledge Bank

Agroecological strategies

Cultural strategies

Cover crops GOOD

Crop rotation GOOD

Biological strategies

Grazing GOOD

Biological agents GOOD

Mechanical/Physical strategies

Mulching GOOD

Solarization

Harrowing GOOD

Green strategies

Robots GOOD

Weed maps

Common names

English: Velvetleaf (GB), Velvet weed (GB), Abutilon-hemp (GB), China-jute (GB)

French: Abutilon d'Avicenne (FR), Abutilon de Theophraste (FR), Abutilon à pétales jaunes (FR), Abutilon (FR), Jute de Chine (FR)

Spanish: Yute Chino (ES), Cenciomolle (ES), Abutilón de la China (ES)

Italian: Cencio molle (IT), Luta cinese (IT)

Portuguese: Folhas-de-veludo (PT), Juta-da-china (PT), Malvão (PT)

Polish: Zaślaz mieszańcowy (PL)

Hungarian: Selyemmályva (HU)

Ukrainian: Абутилон теофраста (UA)

Romanian: Crucea-pîinii (RO), Floarea-crucii (RO), Pristolnic (RO), Teişor (RO)

German: Chinesische Jute (DE), Chinesische Samtpappel (DE), Chinesischer Hanf (DE), Europäische Samtpappel (DE), Samtmalve (DE)

Turkish: Imamkavuşu (TR)

Icelandic: –

Estonian: Kanep-abuutilon (EE)

Belarus, Montenegro, North Macedonia,

Main european biogeographic regions: [Continental](#) [Black Sea](#)

[Mediterranean](#) [Alpine](#) [Atlantic](#) [Boreal](#) [Macaronesian](#)

[Pannonian](#) [Steppic](#) [Anatolian](#) Notes: Few incidence in Alpine

region

Images

Vegetative state



Source: Pl@ntNet

Reproductive state



Source: Pl@ntNet

Seedling stage



Source: PlantwisePlus Knowledge Bank

Agroecological strategies

Cultural strategies

Cover crops **GOOD**

Crop rotation **GOOD**

Biological strategies

Grazing **GOOD**

Biological agents **GOOD**

Mechanical/Physical strategies

Mulching **GOOD**

Solarization

Harrowing **GOOD**

Green strategies

Robots **GOOD**

Weed maps

Common names

English: Velvetleaf (GB), Velvet weed (GB), Abutilon-hemp (GB), China-jute (GB)

French: Abutilon d'Avicenne (FR), Abutilon de Theophraste (FR), Abutilon à pétales jaunes (FR), Abutilon (FR), Jute de Chine (FR)

Spanish: Yute Chino (ES), Cenciomolle (ES), Abutilón de la China (ES)

Italian: Cencio molle (IT), Luta cinese (IT)

Portuguese: Folhas-de-veludo (PT), Juta-da-china (PT), Malvão (PT)

Polish: Zaślaz mieszańcowy (PL)

Hungarian: Selyemmályva (HU)

Ukrainian: Абутилон теофраста (UA)

Romanian: Crucea-pîinii (RO), Floarea-crucii (RO), Pristolnic (RO), Teişor (RO)

German: Chinesische Jute (DE), Chinesische Samtpappel (DE), Chinesischer Hanf (DE), Europäische Samtpappel (DE), Samtmalve (DE)

Turkish: Imamkavuşu (TR)

Icelandic: –

Estonian: Kanep-abuutilon (EE)



1



2



AGROECOLOGY FOR WEEDS

www.goodhorizon.eu

AGROECOLOGICAL WEED MANAGEMENT REPOSITORY

The Agroecological Weed Management (AWM) Repository
(<https://www.goodhorizon.eu/platform/awm-practices/>)

is a virtual space where you can freely and openly find information and educational material on current and agroecological weed management practices in the European Union. You can browse and learn about several weed management practices and crops.

#@Agroecology is GOOD



Version 1.0 – April 2024



03 COVER CROPS

DESCRIPTION & BENEFITS

Cover crops are plant species grown between cash crop cycles or as companion crops in permanent plantations to:

- **improve soil health** by covering and protecting the soil, often during periods when the land would otherwise be left fallow
- **reduce the weed pressure** due to their ability to compete with weeds for resources. Some cover crops release allelopathic compounds that inhibit weed growth, providing natural weed suppression
- **enhance overall agroecosystem resilience**
- **provide an alternative income** resource for farmers

HERRAMIENTAS DE DETECCIÓN

1. Robot autónomo terrestre para la recopilación de datos: Robot móvil inteligente de monitorización (i-MMR)



2. Mecanismo de almacenamiento de datos en la nube: parte del Smart Operation Manager (SOM), con tecnología de FIWARE



3. Análisis de datos mediante estrategias de inteligencia artificial: el módulo de estimación de maleza (WEM), basado en conjuntos de datos y modelos de acceso abierto



Combinación de robótica, plataformas en la nube e inteligencia artificial para mejorar la vigilancia y la detección de malas hierbas a gran escala

GRACIAS

Universidade de Vigo
yedra.vieites.alvarez@uvigo.gal

<https://agrosus.eu/>



https://twitter.com/AGROSUS_HE



<https://www.linkedin.com/company/agrosus-he/posts/?feedView=all>



AGROSUS



Funded by
the European Union